

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう保管してください。

液剤 外用ホルモン塗布剤 **オットピン** 第1類医薬品

OTTOPIN[®]
EXTERNAL HORMONE SPREAD

製品の特徴

男性ホルモンのバランスが崩れると性機能障害が起こります。オットピンには局所粘膜、皮膚の柔軟部から体内に吸収されるメチルテストステロン（男性ホルモン）やオットセイのオイルを配合しておりますので、男子更年期及び更年期以後における精力減退、勃起力減退、早漏、更年期障害、男子一般老衰現象の予防及び回復を助けます。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ご使用前に本剤をピンから3～6滴程出し、内股などの皮ふのうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人。
- (3) アンドロゲン依存性腫瘍【例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍（悪性）】及びその疑いのある人。
- (4) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性、授乳中の人。
- (5) 小児（15歳未満）。
- (6) 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人。
- (7) 前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原（PSA）の値が2.0ng/mL以上の人。（医師の判断に従うこと。）
※本剤の有効成分（メチルテストステロン）は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。
 - a) 特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。
 - b) 継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。
 - c) 検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談すること。
- (8) 睡眠時無呼吸症候群である人。

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻孔等）。
- (2) 陰茎部先端（尿道口）、外陰部。
- (3) 外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位。

3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと

4. 使用者以外へ付着させないこと

- (1) ご使用後は石鹸とぬるま湯で手を十分に洗って下さい。
- (2) 本剤を使用者以外の人に付着させないように注意して下さい。付着した場合は直ちに洗い流して下さい。
- (3) 塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹸とぬるま湯で十分に洗い流して下さい。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 前立腺肥大ではあるが、排尿困難を伴わない人。
 - (3) 薬や化粧品等によるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、水泡など）を起こしたことがある人。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧またはその既往症のある人。
2. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状が現れた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・はれ、かぶれ、かゆみ、水泡、にきび

- (2) 1ヵ月程度使用しても症状の改善がみられない場合。
- (3) 月経異常、或いは変声等の男性化の兆候がみられた場合。
- (4) 誤った使い方をしてしまった場合。

効能・効果

男子更年期及び更年期以後における精力減退、勃起力不全、早漏、陰萎、遺精、前立腺漏、精液漏、男女恥部無毛症、更年期障害（頭痛、倦怠、記憶力減退）、男子一般老衰現象の予防及び回復。

用法・用量

使用時によく振り、中栓の滴下口から手のひらに3～6滴（1滴は約0.03g）を滴下し、男性器、並びに内股等に塗布する。
1日3～5回塗布する。

<用法及び用量に関連する注意>

●定められた用法・用量を厳守してください。●目に入らないように注意してください。万一、目にはいった場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。●ご使用前には、手指をよく洗ってください。●塗布部を清潔にしてからお使いください。●外用のみに使用してください。●本剤が出にくい場合は、よく振ってからご使用ください。

成分・分量（1mL中）

メチルテストステロン……20mg

添加剤として精製オットセイ油、ローズ油、オリーブ油、エタノール、香料（ℓ-メントール）

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 本剤が出すぎた場合は、ピンに戻さないでください。
- (6) ピンは立てた状態で保管してください。

お問い合わせ ☎️ **0120-199301**

製造販売元 受付時間 9:00～17:00まで（土・日・祝日を除く）

 **ヴィタリス製薬株式会社** 埼玉県比企郡吉見町下細谷96
http://www.vitalis.co.jp